

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Παιδιού: _____

Αλλεργία σε: _____

Τηλ Γονέων: Κιν: _____ Εργασία: _____ Σπίτι: _____

Όνοματεπώνυμο Ιατρού: _____ Τηλ: _____

Φωτογραφία
παιδιού

Ασθματικός Ασθενής: Ναι

Όχι

(Αυξημένος κίνδυνος για σοβαρή αντίδραση)

ΗΠΙΕΣ / ΜΕΤΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΔΡΑΣΗ
<p>Μόνο ένα από:</p> <ul style="list-style-type: none">• πρήξιμο χειλιών, βλεφάρων• καντήλες, κοκκινίλες• πόνος στην κοιλιά, έμετος (αν τα συμπτώματα αυτά εμφανιστούν μετά από τσίμπημα εντόμου, η αντίδραση αυτή χαρακτηρίζεται σοβαρή)• φαγούρα στο στόμα	<p>A. Μείνετε κοντά στο παιδί και καλέστε αμέσως βοήθεια B. Χορηγήστε την φαρμακευτική αγωγή 1..... 2..... 3..... 4.....</p> <p>Γ. Αναζητήστε την ANAPEN Δ. Παρακολουθείστε μην τυχόν χειροτερέψουν τα συμπτώματα. Ε. Επικοινωνήστε με την οικογένεια του παιδιού</p>
ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΔΡΑΣΗ
<p>Ένα ή παραπάνω από:</p> <ul style="list-style-type: none">• δυσκολία στην ομιλία ή/και βραχνή φωνή• πρήξιμο της γλώσσας,• σφίξιμο στο λαιμό• γρήγορη αναπνοή, δυσκολία στην αναπνοή• βράσιμο, επίμονος βήχας• χλωμάδα, υποτονία• ζάλη, λιποθυμία <p>Ή συνδυασμός των:</p> <ul style="list-style-type: none">• πομποί, καντήλες, κοκκινίλες• πόνος στην κοιλιά, έμετος, διάρροια• μύτη με καταρροή, φταρνίσματα	<p>A. Ξαπλώστε τον ασθενή στο πάτωμα ή σε κρεβάτι B. Χορηγήστε στον ασθενή την ANAPEN (αδρεναλίνη). Γ. Καλέστε ασθενοφόρο (τηλ 166) Δ. Επικοινωνήστε με την οικογένεια του ασθενή Ε. Χορηγήστε επιπλέον τη φαρμακευτική αγωγή 1..... 2..... 3..... 4.....</p> <p>ΣΤ. Αν τα συμπτώματα δεν αρχίσουν να υποχωρούν σε 5 λεπτά, και υπάρχει 2^η ένεση αδρεναλίνης χορηγήστε τη</p> <p>Τρόπος χρήσης Anapen</p> 